

E. Gubbja Laboratorija

**STS, HIV
UN HEPATĪTU
PANELIS**



Šis panelis apkopo gan seksuāli transmisīvās saslimšanas, HIV vīrusa infekcijas, kā arī B un C hepatītu antivielu analīzes.

STS, HIV UN HEPATĪTU PANELIS IEKĻAUJ 5 ANALĪZES:

STS panelis

Seksuāli transmisīvo infekciju analīzes nosaka septiņas seksuāli transmisīvās infekcijas – *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma genitalium*, *Ureaplasma urealyticum*, *Ureaplasma parvum*.

HBsAg

B hepatīta virsmas antigēns. B hepatīta vīrusa (HBV) endēmiskie apgabali atrodami visā pasaulē, un tas ir galvenais aknu slimību cēlonis.

B hepatīta virsmas antigēns (HBsAg) ir seroloģisks marķieris, kas liecina par akūtu vai hronisku B hepatīta infekciju. HBsAg ir pirmais antigēns, kas konstatējams pēc inficēšanās ar B hepatīta vīrusu, to parasti var noteikt 1–10 nedēļas pirms klīnisko simptomu parādīšanās.

TPHA

Tests ir paredzēts sifilisa infekcijas noteikšanai.

Anti HCV

Antivielas pret hepatīta C vīrusu. Antivielas pret HCV liecina, ka indivīdam varētu būt HCV infekcija. Ja anti HCV E. Gulbja laboratorijā primāri pozitīvs, tiek noteikts HCV RNS.

Anti HIV 1/2, HIV 1

Tests paredzēts HIV 1 p 24 antigēna un HIV 1 un HIV 2 antivielu noteikšanai.



Analizējamais materiāls –
asinis un urīns

×



Ārsta nosūtījums
nav nepieciešams

×



Maksa par analīzi –
61,00 EUR

PANELI VAR NODOT JEBKURĀ E. GULBJA LABORATORIJAS FILIĀLĒ

www.egl.lv | +371 6780 1112